Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales en Esquizofrenia: perfil demográfico del usuario en el encuadre público.

Cabrera, C (1); Martínez, M (2); González, C (3); Hernández, C.N (4); Santana, A (5); Bravo, M.F (6); Fernández, A (7).

(1). Unidad de Salud Mental de Ciudad Alta. Hospital Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.
(2). Hospital Doctor Negrin. Las Palmas de Gran Canaria
(3) Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid.
(4). Departamento de Matemáticas. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
(5). Departamento de Matemáticas. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
(6). Hospital Universitario La Paz. Madrid.
(7). Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.

Servicio Canario de la Salud

Gobierno de Canarias

Leyenda:

- Cs: Contactos
- CPs: Contactos psicoterapéuticos
- CIPs: Contactos con intervención psicosocial

Objetivos

Conocer el perfil epidemiológico del paciente diagnosticado de Esquizofrenia que recibe CPs (incluyen CIPs) en el entorno público.

Métodos

Se dispone del registro de actividad de la red de salud mental de las áreas 3 y 9 de la Comunidad de Madrid de 1986 a 2005 (Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos). Incluye tipo de atención, grupo diagnóstico, sexo y estado civil en cada contacto de un paciente a un dispositivo de salud mental.

Resultados:

Sobre un total de 570.304 CPs la Esquizofrenia abarca el 10,75% (total de 61.346 CPs). Suponen el 44,56% de todos los Cs en Esquizofrenia. De los 35.753 CPs con sexo y estado civil registrados, 27.269 fueron masculinos (76,27%). 26.848 Cs fueron de solteros/as (75,09%, de los cuales 83,07% fueron masculinos), 5.200 de casados/as (14,54%, de los cuales el 46,19% fueron masculinos), 3.705 separados/divorciados (10,36%, de los cuales el 69,14 % fueron masculinos).

Diagnostico	Frecuencia de psicoterapia	Frecuencia global del Dco	Proporción de Contactos PT
Sin Diagnóstico	65543	134785	48,62%
Esquizofrenia	61346	137642	44,56%
Otras Psicosis	21720	49526	43,85%
Psicosis Afectivas	30682	79618	38,53%
Ttnos. de la Personalidad	31350	55352	56,63%
Ttnos. de Ansiedad	44988	73843	60,91%
Depresión	26981	46975	57,43%
Uso de sustancias	12909	29707	43,45%
Ttnos. Orgánicos	2371	7531	31,48%
Otros ttnos. Neuróticos	3722	5872	63,38%
Ttnos de la Alimentación	12486	17553	71,13%
Ttnos Adaptativos	17164	24904	68,902%
Retraso Mental	4144	10748	38,55%
Códigos V	6096	13810	44,14%
Otros	228802	402234	56,88%
Total	570304	1090100	

Proporción de contactos psicoterapéuticos por grupos diagnósticos.



Proporción de contactos psicoterapéuticos por grupos diagnósticos.

Diagnósticos	
9.Ttnos de la Alimentación	10.Códigos V
7.Ttnos Adaptativos	6.Otras Psicosis
12.Otros ttnos. Neuróticos	8.Uso de sustancias
2.Ttnos. de Ansiedad	11.Retraso Mental
5.Depresión	4.Psicosis Afectivas
3.Ttnos. de la Personalidad	13.Ttnos. Orgánicos
1.Esquizofrenia	14.Sin Diagnóstico



Conclusiones

La Esquizofrenia es la principal beneficiaria de psicoterapia e intervenciones psicosociales en nuestra población, siendo estas predominantemente sobre hombres solteros. La predominancia masculina se hace más patente en CPs de solteros y separados, estando más igualada entre sexos en CPs de casados/as.